

Vordiplomsklausur zur Linearen Algebra I

Prof. Dr. G. Hiß

Tragen Sie bitte auf diesem Deckblatt leserlich und in **Blockbuchstaben** Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer ein und unterschreiben Sie.

Name: _____

Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Eigenhändige Unterschrift: _____

| | Krz | Rech | 11 | 12 | 13 | 14 | Σ | Zensur | Zus.Prüf. | Gesamt |
|--------|-----|------|----|----|----|----|----------|--------|-----------|--------|
| Punkte | | | | | | | | | | |
| Nachk. | | | | | | | | | | |

Zum Ankreuzteil:

Kreuzen Sie bei jeder Frage entweder „Ja“ oder „Nein“ oder nichts an.

Auswertung: Jedes richtige Kreuz gibt einen Pluspunkt, jedes falsche Kreuz einen Minuspunkt. Jede Aufgabe gibt immer mindestens 0 Punkte, Minuspunkte wirken also nicht über Aufgaben hinweg. Wenn Sie bei einer Frage unsicher sind, machen Sie einfach kein Kreuz.

Sie brauchen Ihre Kreuze nicht zu begründen!

Zu den Rechenaufgaben:

In diesem Teil müssen Sie Ihre Aussagen **nicht** begründen. Es zählt nur das richtige Ergebnis.

Zu den Aufgaben mit Begründungen:

In diesem Teil müssen Sie alle Aussagen begründen.

Natürlich brauchen Sie Aussagen aus der Vorlesung nicht noch einmal zu beweisen.

Klausureinsicht: _____

(Eigenhändige Unterschrift)

Vordiplomsklausur, Ankreuzteil, 25.3.2002

Lineare Algebra I, Prof. Dr. G. Hiß

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Kreuzen Sie bei jeder Frage entweder „Ja“ oder „Nein“ oder nichts an.

Auswertung der Multiple-Choice-Aufgaben: Ein richtiges Kreuz ergibt +1 Punkt, ein falsches Kreuz ergibt -1 Punkt, keine Angabe zählt 0 Punkte. In jeder Aufgabe bekommen Sie mindestens 0 Punkte.

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Sind die folgenden Aussagen richtig? | |
| | Jedes lineare Gleichungssystem mit mehr Gleichungen als Unbekannten hat höchstens eine Lösung. | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| | Ein homogenes lineares Gleichungssystem mit genau einer Lösung hat mindestens so viele Gleichungen wie Unbekannte. | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| | Ein inhomogenes lineares Gleichungssystem mit weniger Gleichungen als Unbekannten hat mindestens zwei verschiedene Lösungen. | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| 2 | Seien V und W endlich-dimensionale Vektorräume über einem Körper K und $\varphi : V \rightarrow W$ eine K -lineare Abbildung. Weiter seien $X \subseteq V$ und $Y \subseteq W$ endliche Teilmengen. Sind die folgenden Aussagen richtig? | |
| | Falls φ injektiv ist und X linear unabhängig ist, so ist $\varphi(X)$ auch linear unabhängig und hat genau so viele Elemente wie X . | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| | Falls φ surjektiv ist, sowie $Y = \varphi(X)$ und Y linear unabhängig, so ist auch X linear unabhängig. | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| | Falls X und Y linear unabhängig sind und X und Y gleich viele Elemente besitzen, so gibt es eine lineare Abbildung $\psi : V \rightarrow W$ mit $\psi(X) = Y$. | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 3 | Sind die folgenden Aussagen über Untervektorräume richtig? | |
| | Für jeden Körper K und jedes $n \in \mathbb{N}$ bilden die Polynome vom Grad $\leq n$ zusammen mit dem Nullpolynom einen K -Untervektorraum des Polynomringes $K[X]$. | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| | $\{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ ist beschränkt}\}$ ist ein \mathbb{R} -Untervektorraum von $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| | Für einen Körper K und $n, m \in \mathbb{N}$ ist die Teilmenge der Matrizen in $K^{n \times m}$, deren Einträge die Summe Null haben, ein Untervektorraum von $K^{n \times m}$. | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 4 | Es seien K ein Körper und $\varphi : V \rightarrow W$ und $\psi : W \rightarrow V$ lineare Abbildungen zwischen den K -Vektorräumen V und W . Welche der folgenden Aussagen sind wahr? | |
| | Kern $(\psi \circ \varphi) \subseteq$ Kern φ | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| | Bild $(\psi \circ \varphi) \subseteq$ Bild ψ | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| | Kern $(\psi \circ \varphi) \subseteq$ Bild $(\varphi \circ \psi)$ | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

| | | |
|---|--|--|
| 5 | Sind die folgenden Aussagen richtig? | |
| | Sei $n \in \mathbb{N}$ und $A \in \text{GL}_n(\mathbb{Z})$. Dann gilt $\det(A) = \det(A^{-1})$. | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| | Sei K ein Körper, $n \in \mathbb{N}$ und $A \in K^{n \times n}$. Dann ist A genau dann invertierbar, wenn $\det(A)$ in K invertierbar ist. | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| | Sei K ein Körper, $n \in \mathbb{N}$ und $A, B, C \in K^{n \times n}$. Falls $\det(A(B + C)) \neq 0$ ist, so ist mindestens eine der Matrizen B oder C invertierbar. | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| 6 | Sei $n \in \mathbb{N}$. Welche der folgenden Aussagen sind richtig? | |
| | Falls n ungerade ist und $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist, so besitzt A einen Eigenwert in \mathbb{R} . | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| | Sei K ein Körper und $A \in K^{n \times n}$. Weiter sei v ein Eigenvektor von A zu einem Eigenwert $a \in K$ und w ein Eigenvektor von A zu einem Eigenwert $b \in K$ und $v \neq w$. Genau dann ist $v - w$ auch ein Eigenvektor von A , wenn $a = b$ gilt. | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| | Sei $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ und v Eigenvektor von A zu einem Eigenwert $a \in \mathbb{C}$ mit $a \neq 0$. Dann ist $-v$ ein Eigenvektor von A zum Eigenwert $-a$. | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

| | |
|----|--|
| 9 | <p>Es sei $V = \mathbb{R}^{3 \times 1}$ mit dem Standardskalarprodukt und $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$ die folgende geordnete Basis von V:</p> $\mathcal{B} := \left(\left(\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \\ 3 \end{pmatrix} \right).$ <p>Geben Sie eine Orthonormalbasis $\mathcal{C} = (w_1, w_2, w_3)$ von V an für die gilt: $\langle v_1 \rangle = \langle w_1 \rangle$ und $\langle v_1, v_2 \rangle = \langle w_1, w_2 \rangle$.</p> $w_1 = \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix} \quad w_2 = \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix} \quad w_3 = \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix}$ <p style="text-align: right;"><i>(1 Punkt pro richtiger Spalte: insgesamt 3 Punkte)</i></p> |
| 10 | <p>Es sei $A \in \mathbb{Q}^{4 \times 4}$ die folgende Matrix:</p> $A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & -12 & 1 \\ -7 & 2 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & -47 & 4 \end{pmatrix}.$ <p>(i) Berechnen Sie das charakteristische Polynom χ_A von A:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 400px;"> $\chi_A =$ </div> <p style="text-align: right;"><i>(2 Punkte)</i></p> <p>(ii) Geben Sie die Eigenwerte von A an:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 400px;"> Eigenwerte von A: </div> <p style="text-align: right;"><i>(1 Punkt)</i></p> <p>(iii) Geben Sie die Dimensionen der Eigenräume an:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 400px;"> Dimensionen der Eigenräume von A: </div> <p style="text-align: right;"><i>(2 Punkte)</i></p> |

Vordiplomsklausur, 25.3.2002, schriftlicher Teil, **Gruppe A**

Beantworten Sie die folgenden Aufgaben schriftlich. Beweisen Sie alle Ihre Behauptungen. Schreiben Sie auf **jedes Blatt** Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer. Fangen Sie jede Aufgabe auf einer neuen Seite an.

| | |
|----|---|
| 11 | <p>Es sei K ein Körper, $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ und $v \in K^{n \times 1}$ ein Spaltenvektor ungleich 0. Weiter sei $A := v \cdot v^t$. Zeigen Sie, dass A den Eigenwert 0 hat. Welche Dimension hat der Eigenraum von A zum Eigenwert 0? <i>(4 Punkte)</i></p> |
| 12 | <p>Für welche $n \in \mathbb{N}$ gilt die folgende Aussage? Für alle $A \in \mathbb{Q}^{n \times n}$ gilt $A \cdot A^t = A^t \cdot A$. Vergessen Sie nicht die Begründung. <i>(4 Punkte)</i></p> |
| 13 | <p>Es sei K ein Körper, $n \in \mathbb{N}$ und $A \in K^{n \times n}$ eine invertierbare Matrix. Zeigen Sie, dass es dann ein Polynom $f \in K[X]$ gibt, so dass $f(A) = A^{-1}$ ist. <i>(4 Punkte)</i></p> |
| 14 | <p>Es sei K ein Körper, $2 \leq n \in \mathbb{N}$ und $A \in K^{n \times n}$ eine diagonalisierbare Matrix. Zeigen Sie, dass dann für jedes Polynom $f \in K[X]$ die Matrix $f(A)$ auch diagonalisierbar ist. <i>(3 Punkte)</i></p> |

Vordiplomsklausur, Ankreuzteil, 25.3.2002

Lineare Algebra I, Prof. Dr. G. Hiß

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Kreuzen Sie bei jeder Frage entweder „Ja“ oder „Nein“ oder nichts an.

Auswertung der Multiple-Choice-Aufgaben: Ein richtiges Kreuz ergibt +1 Punkt, ein falsches Kreuz ergibt -1 Punkt, keine Angabe zählt 0 Punkte. In jeder Aufgabe bekommen Sie mindestens 0 Punkte.

| | | | |
|---|--|-----------------------------|--|
| 1 | Sind die folgenden Aussagen richtig? | | |
| | Sei $n \in \mathbb{N}$ und $A \in GL_n(\mathbb{Z})$. Dann gilt $\det(A) = \det(A^{-1})$. | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| | Sei K ein Körper, $n \in \mathbb{N}$ und $A \in K^{n \times n}$. Dann ist A genau dann invertierbar, wenn $\det(A)$ in K invertierbar ist. | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| | Sei K ein Körper, $n \in \mathbb{N}$ und $A, B, C \in K^{n \times n}$. Falls $\det(A(B + C)) \neq 0$ ist, so ist mindestens eine der Matrizen B oder C invertierbar. | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| 2 | Sei $n \in \mathbb{N}$. Welche der folgenden Aussagen sind richtig? | | |
| | Falls n ungerade ist und $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist, so besitzt A einen Eigenwert in \mathbb{R} . | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| | Sei K ein Körper und $A \in K^{n \times n}$. Weiter sei v ein Eigenvektor von A zu einem Eigenwert $a \in K$ und w ein Eigenvektor von A zu einem Eigenwert $b \in K$ und $v \neq w$. Genau dann ist $v - w$ auch ein Eigenvektor von A , wenn $a = b$ gilt. | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| | Sei $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ und v Eigenvektor von A zu einem Eigenwert $a \in \mathbb{C}$ mit $a \neq 0$. Dann ist $-v$ ein Eigenvektor von A zum Eigenwert $-a$. | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| 3 | Seien V und W endlich-dimensionale Vektorräume über einem Körper K und $\varphi : V \rightarrow W$ eine K -lineare Abbildung. Weiter seien $X \subseteq V$ und $Y \subseteq W$ endliche Teilmengen. Sind die folgenden Aussagen richtig? | | |
| | Falls φ injektiv ist und X linear unabhängig ist, so ist $\varphi(X)$ auch linear unabhängig und hat genau so viele Elemente wie X . | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| | Falls φ surjektiv ist, sowie $Y = \varphi(X)$ und Y linear unabhängig, so ist auch X linear unabhängig. | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| | Falls X und Y linear unabhängig sind und X und Y gleich viele Elemente besitzen, so gibt es eine lineare Abbildung $\psi : V \rightarrow W$ mit $\psi(X) = Y$. | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| 4 | Sind die folgenden Aussagen richtig? | | |
| | Jedes lineare Gleichungssystem mit mehr Gleichungen als Unbekannten hat höchstens eine Lösung. | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| | Ein homogenes lineares Gleichungssystem mit genau einer Lösung hat mindestens so viele Gleichungen wie Unbekannte. | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |
| | Ein inhomogenes lineares Gleichungssystem mit weniger Gleichungen als Unbekannten hat mindestens zwei verschiedene Lösungen. | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

| | | |
|---|--|---|
| 5 | Sind die folgenden Aussagen über Untervektorräume richtig? | |
| | Für jeden Körper K und jedes $n \in \mathbb{N}$ bilden die Polynome vom Grad $\leq n$ zusammen mit dem Nullpolynom einen K -Untervektorraum des Polynomringes $K[X]$. | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| | $\{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ ist beschränkt}\}$ ist ein \mathbb{R} -Untervektorraum von $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| | Für einen Körper K und $n, m \in \mathbb{N}$ ist die Teilmenge der Matrizen in $K^{n \times m}$, deren Einträge die Summe Null haben, ein Untervektorraum von $K^{n \times m}$. | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| 6 | Es seien K ein Körper und $\varphi : V \rightarrow W$ und $\psi : W \rightarrow V$ lineare Abbildungen zwischen den K -Vektorräumen V und W . Welche der folgenden Aussagen sind wahr? | |
| | Kern $(\psi \circ \varphi) \subseteq$ Kern φ | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| | Bild $(\psi \circ \varphi) \subseteq$ Bild ψ | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| | Kern $(\psi \circ \varphi) \subseteq$ Bild $(\varphi \circ \psi)$ | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Vordiplomsklausur, 25.3.2002, Rechenteil, **Gruppe B**

Bearbeiten Sie die folgenden Rechenaufgaben und schreiben Sie die Ergebnisse in die dafür vorgesehenen Kästchen. Sie brauchen Ihre Ergebnisse **nicht** zu begründen, für Begründungen und Ansätze gibt es aber auch **keine** Punkte. Für jede richtige Antwort bekommen Sie die angegebene Punktzahl. Für falsche Antworten gibt es **Null** Punkte.

7 Es sei $\mathbb{F}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ der Körper mit 5 Elementen und $A \in \mathbb{F}_5^{4 \times 4}$ und $b \in \mathbb{F}_5^{4 \times 1}$ gegeben durch:

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad b := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie die Inverse A^{-1} und bestimmen Sie die Lösung des linearen Gleichungssystems $Ax = b$ für $x \in \mathbb{F}_5^{4 \times 1}$.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ \hline & & & \\ \hline | & | & | & | \\ \hline & & & \\ \hline | & | & | & | \\ \hline & & & \\ \hline \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix}.$$

(4 Punkte für A^{-1} und 1 Punkt für x : insgesamt 5 Punkte)

8 Es sei $\varphi : \mathbb{Q}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{Q}^{2 \times 2}$ durch

$$\varphi(A) := A + 2 \cdot A^t.$$

gegeben. Berechnen Sie die Matrix $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(\varphi)$ der linearen Abbildung φ bezüglich der geordneten Basen

$$\mathcal{B} := \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

und

$$\mathcal{C} := \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right).$$

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ \hline & & & \\ \hline | & | & | & | \\ \hline & & & \\ \hline | & | & | & | \\ \hline & & & \\ \hline \end{pmatrix}$$

(1 Punkt pro richtiger Spalte: insgesamt 4 Punkte)

| | |
|----|---|
| 9 | <p>Es sei $A \in \mathbb{Q}^{4 \times 4}$ die folgende Matrix:</p> $A := \begin{pmatrix} 1 & 0 & -12 & 1 \\ -7 & 2 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & -47 & 4 \end{pmatrix}.$ <p>(i) Berechnen Sie das charakteristische Polynom χ_A von A:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 400px; height: 25px; vertical-align: middle;"> $\chi_A =$ </div> <div style="float: right; text-align: right;">(2 Punkte)</div> <p>(ii) Geben Sie die Eigenwerte von A an:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 400px; height: 25px; vertical-align: middle;"> Eigenwerte von A: </div> <div style="float: right; text-align: right;">(1 Punkt)</div> <p>(iii) Geben Sie die Dimensionen der Eigenräume an:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 550px; height: 25px; vertical-align: middle;"> Dimensionen der Eigenräume von A: </div> <div style="float: right; text-align: right;">(2 Punkte)</div> |
| 10 | <p>Es sei $V = \mathbb{R}^{3 \times 1}$ mit dem Standardskalarprodukt und $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$ die folgende geordnete Basis von V:</p> $\mathcal{B} := \left(\left(\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \\ 3 \end{pmatrix} \right) \right).$ <p>Geben Sie eine Orthonormalbasis $\mathcal{C} = (w_1, w_2, w_3)$ von V an für die gilt: $\langle v_1 \rangle = \langle w_1 \rangle$ und $\langle v_1, v_2 \rangle = \langle w_1, w_2 \rangle$.</p> $w_1 = \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix} \quad w_2 = \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix} \quad w_3 = \begin{pmatrix} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{pmatrix}$ <p style="text-align: right;">(1 Punkt pro richtiger Spalte: insgesamt 3 Punkte)</p> |

Vordiplomsklausur, 25.3.2002, schriftlicher Teil, **Gruppe B**

| | |
|---|---|
| <p>Beantworten Sie die folgenden Aufgaben schriftlich. Beweisen Sie alle Ihre Behauptungen. Schreiben Sie auf jedes Blatt Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer. Fangen Sie jede Aufgabe auf einer neuen Seite an.</p> | |
| 11 | <p>Es sei K ein Körper, $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ und $v \in K^{n \times 1}$ ein Spaltenvektor ungleich 0. Weiter sei $A := v \cdot v^t$. Zeigen Sie, dass A den Eigenwert 0 hat. Welche Dimension hat der Eigenraum von A zum Eigenwert 0? (4 Punkte)</p> |
| 12 | <p>Für welche $n \in \mathbb{N}$ gilt die folgende Aussage? Für alle $A \in \mathbb{Q}^{n \times n}$ gilt $A \cdot A^t = A^t \cdot A$. Vergessen Sie nicht die Begründung. (4 Punkte)</p> |
| 13 | <p>Es sei K ein Körper, $n \in \mathbb{N}$ und $A \in K^{n \times n}$ eine invertierbare Matrix. Zeigen Sie, dass es dann ein Polynom $f \in K[X]$ gibt, so dass $f(A) = A^{-1}$ ist. (4 Punkte)</p> |
| 14 | <p>Es sei K ein Körper, $2 \leq n \in \mathbb{N}$ und $A \in K^{n \times n}$ eine diagonalisierbare Matrix. Zeigen Sie, dass dann für jedes Polynom $f \in K[X]$ die Matrix $f(A)$ auch diagonalisierbar ist. (3 Punkte)</p> |