G. Nebe, M. Künzer 01.09.2006

Diskrete Strukturen, SS 06

Lösung zur Vordiplomsklausur

Aufgabe 1

(1) Wir haben $\binom{5}{3} = 10$ Möglichkeiten.

(2) Die Konjugationsklasse von $(1,2)(3,4)(5,6)$ in $\mathcal{S}_8$ enthält $\frac{8!}{2^3 \cdot 2! \cdot 3!} = 420$ Elemente.

(3) Die Anzahl der surjektiven Abbildungen von $\{1,2,3,4,5\}$ nach $\{1,2,3,4\}$ ergibt sich zu

$$\sum_{i=0}^{4} (-1)^i \binom{4}{i} (4-i)^5 \;=\; 1 \cdot 4^5 - 4 \cdot 3^5 + 6 \cdot 2^5 - 4 \cdot 1^5 + 1 \cdot 0^5 \;=\; 240\ .$$

(4) Die Anzahl der normierten irreduziblen Polynome von Grad 8 in $\mathbf{F}_3[X]$ ergibt sich zu

$$\frac{1}{8} \sum_{d|8} 3^d \mu(8/d) \;=\; \frac{1}{8}\left(-3^4 + 3^8\right) \;=\; 810\ .$$

Aufgabe 2

Wir erstellen einen Baum zur Berechnung von $G \cdot 2$ und von $\mathrm{Stab}_G(2)$.



Somit ist $G \cdot 2 = \{2, 6\}$, und $|G \cdot 2| = 2$ (Antwort zu (1)). Ferner ist $\mathrm{Stab}_G(2) = \langle b = (1,3),\ c := (4,5)\rangle$.

Wir erstellen einen Baum zur Berechnung von $\mathrm{Stab}_G(2) \cdot 1$ und von $\mathrm{Stab}_G(1)$.



Somit ist $\mathrm{Stab}_G(2)\cdot 1 = \{1,3\}$, und $|\,\mathrm{Stab}_G(2)\cdot 1| = 2$ (Antwort zu (2)). Ferner ist $\mathrm{Stab}_G(1,2) = \langle c = (4,5)\rangle$.

Direkt erkennen wir, daß $\mathrm{Stab}_G(1,2)\cdot 4 = \{4,5\}$ und $|\,\mathrm{Stab}_G(1,2)\cdot 4| = 2$ (Antwort zu (3)).

Insgesamt wird $|G| = \frac{|G|}{|\,\mathrm{Stab}_G(1)|}\cdot\frac{|\,\mathrm{Stab}_G(1)|}{|\,\mathrm{Stab}_G(1,2)|}\cdot|\,\mathrm{Stab}_G(1,2)| = |G\cdot 2|\cdot|\,\mathrm{Stab}_G(2)\cdot 1|\cdot|\,\mathrm{Stab}_G(1,2)| = 2\cdot 2\cdot 2 = 8$ (Antwort zu (4)).

Aufgabe 3

(1) Mittels des Euklidschen Algorithmus bestimmen wir Polynome $s(X)$ und $t(X)$ so, daß

$$1 \;=\; s(X)\cdot(X^5+X^2+1)+t(X)\cdot(X^2+1)\,.$$

Wir erhalten z.B.

$$1 \;=\; X\cdot(X^5+X^2+1)+(X^4+X^2+X+1)\cdot(X^2+1)\,.$$

Einsetzen von δ gibt

$$1 \;=\; \delta\cdot(\delta^5+\delta^2+1)+(\delta^4+\delta^2+\delta+1)\cdot(\delta^2+1) \;=\; (\delta^4+\delta^2+\delta+1)\cdot(\delta^2+1)\,,$$

und also $(\delta^2+1)^{-1} = \delta^4+\delta^2+\delta+1$.

(2) Es ist $\mathbf{F}_{32}^* \simeq C_{31}$. Da 31 prim ist, ist diese Gruppe von jedem Element ungleich 1 erzeugt. Da $\delta^2+1\neq 1$, ist insbesondere δ^2+1 ein Erzeuger von $\mathbf{F}_{32}^*$.

Aufgabe 4

Die Inzidenzmatrix unseres Graphen ist $A := \left(\begin{smallmatrix}1&2&1\\2&0&2\\1&2&1\end{smallmatrix}\right)$. Der Eintrag an Position (i,j) von A^2 gibt die Anzahl der Kantenzüge der Länge 2 von i nach j. Wir müssen also alle Einträge von A^2 aufaddieren. Da $A^2 = \left(\begin{smallmatrix}6&4&6\\4&8&4\\6&4&6\end{smallmatrix}\right)$, erhalten wir 48 Kantenzüge der Länge 2.

Aufgabe 5

(1) Es ist $(11-1)\cdot(7-1) = 60$. Mittels Euklid ermittelt man, daß $1 = 2\cdot 60 - 17\cdot 7$. Das Inverse von $v = 7$ in $\mathbf{Z}/60\mathbf{Z}$ wird also repräsentiert von -17, oder aber, im vorgeschriebenen Intervall, von $e = 43$.

(2) Es ist $5^7 \equiv_{11\cdot 7} 47$.

(3) Es ist $2^{43} \equiv_{11\cdot 7} 30$.

Aufgabe 6

(1) Die Erzeugermatrix in Zeilenstufenform ist $\left(\begin{smallmatrix}1&0&\omega&\omega\\0&1&0&1\end{smallmatrix}\right)$. Dies liefert z.B. die Prüfmatrix $\left(\begin{smallmatrix}\omega&\omega\\0&1\\1&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)$.

(2) Es gibt in der Prüfmatrix kein linear abhängiges Zeilentupel der Länge 1 (d.h. keine Nullzeile), wohl aber ein linear abhängiges Zeilentupel der Länge 2, bestehend aus der 2-ten und der 4-ten Zeile. Somit erhalten wir den Minimalabstand $d(C) = 2$.

Aufgabe 7

(1) Als Nullstelle ergibt sich durch Probieren zunächst etwa β^3. Daraus erhalten wir die weiteren Nullstellen $(\beta^3)^2 = \beta^6$ und $(\beta^3)^4 = \beta^{12} = \beta^5$. Da $\deg f = 3$ ist, erhalten wir $\{\beta^3,\,\beta^5,\,\beta^6\}$ als Nullstellenmenge von $f(X)$. Alternativ hat diese Menge auch die Form $\{\beta+1,\,\beta^2+\beta+1,\,\beta^2+1\}$.

(2) Es ist β eine primitive 7-te Einheitswurzel (da $\beta\neq 1$). Deren 2 aufeinanderfolgende Potenzen β^5 und β^6 sind Nullstellen von $f(X)$. Also beträgt der designierte Minimalabstand $2+1 = 3$.

(3) Eine Prüfmatrix von C ist gegeben durch

$$\left(\begin{smallmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\\1&1&0\\1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{smallmatrix}\right).$$

In dieser ist jedes aus 2 Zeilen bestehende Tupel linear unabhängig, wie eine direkte Prüfung ergibt. Also ist $d(C)\geq 3$. Hierfür kann man alternativ auch das Ergebnis aus (2) heranziehen.

Hingegen ist das aus der 1-ten, der 2-ten und der 4-ten Zeile gebildete Tupel linear abhängig. Also ist auch $d(C) \leq 3$.

Im vorliegenden Fall stimmen also Minimalabstand und designierter Minimalabstand überein.

Alternativ kann man auch mit (2) und der Standarderzeugermatrix arbeiten.

(4) Der Minimalabstand ist $d = d(C) = 3$, die Länge ist $N = 7$. Die Hammingschranke ergibt sich für diese Parameter zu $7 - \log_2(\mathrm{V}_2(7,1)) = 7 - \log_2\left(\binom{7}{0} + \binom{7}{1}\right) = 7 - 3 = 4$. Die Dimension von C ist ebenfalls gleich 4. Die Hammingschranke, die eine obere Schranke für diese Dimension darstellt, wird also angenommen.

Aufgabe 8

Die Aussage ist richtig. Es ist $U \cap V$ eine Untergruppe von U, und folglich $|U \cap V|$ ein Teiler von $|U|$. Genauso ist $U \cap V$ eine Untergruppe von V, und folglich $|U \cap V|$ ein Teiler von $|V|$. Da der größte gemeinsame Teiler von $|U|$ und $|V|$ gleich 1 ist, folgt $|U \cap V| = 1$, und also $U \cap V = \{1\}$.